




SUMITOMO CHEMICAL

Creative Hybrid Chemistry
For a Better Tomorrow



Juvinal[®]
GOLD

Juvinal Gold[®] è un prodotto originale Sumitomo Chemical a base di **Pyriproxyfen**, insetticida caratterizzato da:

- Singolo principio attivo ad alta efficienza
- Prolungata efficacia e bassi intervalli di pre-raccolta
- Perfetta selettività sulle colture e sui principali beneficials
- Ideale per strategie anti-resistenza

**VELOCITÀ E PERSISTENZA
CONTRO LE COCCINIGLIE**




SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

www.sumitomo-chem.it



La combinazione di Juvinal Gold® e Kestrel® a base di Acetamiprid rappresenta il massimo dell'efficacia per il controllo della COCCINIGLIA ROSSA FORTE DEGLI AGRUMI.

Il controllo precoce di Juvinal Gold®, da applicare alla comparsa delle prime forme mobili, viene infatti completato dall'efficacia sistemica di Kestrel® contro gli adulti.



COLTURE	DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO	PITTOGRAMMI	FRASI H
AGRUMI	<p>Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di <i>Parlatoria sp.</i> trattare quando le prime larve sono visibili.</p> <p>Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (<i>Lepidosaphes sp.</i>), Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha); Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (<i>Aonidiella aurantii</i>), Parlatoria (<i>Parlatoria sp.</i>), Cocciniglia bianca degli agrumi (<i>Aspidiotus neri</i>) 50-75 ml/hl (pari a 1-2,25 l/ha); Cocciniglia di San José (<i>Quadraspidotus perniciosus</i>) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha).</p> <p>Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.</p>		<p>PERICOLO H304, H315, H400, H411</p>
		IRAC 7A	

REGISTRATO SU OLIVO, AGRUMI, POMACEE E DRUPACEE (PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (IN SERRA) E MELANZANA (IN CAMPO E SERRA), COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 14 GIORNI PER PESCO, NETTARINA E SUSINO, 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE, ALBICOCCO E CILIEGIO TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).