




LA MICORIZZAZIONE DELLE BARBATELLE

I principali benefici della micorizzazione

- **Incrementa le funzioni fisiologiche** durante tutto il ciclo colturale
- **Espande la funzionalità delle radici** tramite una fitta rete di ife incrementandone la superficie di oltre 600 volte
- **Migliora l'efficienza nutrizionale** producendo enzimi in grado di liberare nutrienti altrimenti immobilizzati nel suolo: Azoto, Fosforo e Microelementi
- **Migliora l'efficienza idrica**, l'assorbimento dell'acqua e la **tolleranza agli stress** abiotici come caldo e siccità



MICORRIZE IDROSOLUBILI
con una concentrazione di 132.000 propaguli/kg
4 ceppi presenti (*Rhizophagus irregularis*, *Claroideoglomus luteum*, *Claroideoglomus etunicatum* e *Claroideoglomus claroideum*) con **acidi umici** e batteri benefici della rizosfera.
 Filtri utilizzabili: fino a 400 mesh.



CONCIME MICROGRANULARE FOSFO-AZOTATO NP 5-16
con micorrize concentrate e attive
4 ceppi di micorrize presenti (vedi sopra), matrice organica nobile **completamente biodisponibile**, azoto organico a **lento rilascio**, fosforo completamente biodisponibile proveniente da **fosfati naturali teneri**.



DOSI E UTILIZZO CONSIGLIATO

FASE VIVAISTICA

Trapianto in barbatellaio:

MycoApply DR 0,1-0,2 g per ogni pianta oppure MycoStart BIO 5-10 g/pianta

Al momento del trapianto si suggerisce di mescolare bene il prodotto al terreno e di non superare la dose consigliata.

Fertirrigazione in barbatellaio (fase di radicazione delle barbatelle):

MycoApply DR 2 kg/ha

1. Iniziare l'irrigazione solo con acqua e inumidire il terreno (50% volume irrigazione);
2. Sciogliere MycoApply DR e applicare la soluzione irrorando una quantità d'acqua sufficiente (30% volume irrigazione, miscelabile anche con fertilizzanti);
3. Continuare l'irrigazione solo con acqua per favorire una migliore penetrazione nella rizosfera (20% volume irrigazione).

FASE DI IMPIANTO DEL VIGNETO

Inzaffardatura o bagnetto proteico radicale pre-trapianto:

MycoApply DR 0,5 kg/hl

Da miscelare nelle quantità d'acqua utilizzata di consueto.

Al trapianto:

MycoStart BIO 5-10 g/pianta

Al momento del trapianto si suggerisce di mescolare bene il prodotto al terreno e di non superare la dose consigliata.

Irrigazione post-trapianto:

MycoApply DR 0,1-0,2 g per ogni pianta

(vedi sopra, come fertirrigazione in barbatellaio)

Per impianti già esistenti o per richiamo II e III anno:

MycoApply DR 2-2,5 kg/ha (vedi sopra, come fertirrigazione in barbatellaio)

Nota bene:

È possibile miscelare con i comuni concimi (usando prodotti con pH compreso tra 4,5 e 8 ed evitando dosi di fosforo superiori a 100 ppm). Compatibile con la maggior parte dei fungicidi. Compatibile con la maggior parte dei fungicidi.

