

PREV-AM

PLUS

Insetticida, fungicida polivalente
efficace e veloce in poche ore



Fitofarmaco a base di **OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE (60 g/l)**.


Prodotto naturale ottenuto dalla spremitura a freddo di arance dolci.

Autorizzato su vite, orticole, tabacco e numerose colture frutticole e ornamentali.

PREV-AM® PLUS è un insetticida-fungicida che agisce per contatto con un modo d'azione fisico. Utilizzato in miscela migliora l'efficienza e l'efficacia di insetticidi e fungicidi.

CONTROLLA:

- Oidio
- Peronospora
- Insetti a corpo molle (Aleurodidi, Cicaline, Tripidi)



DISIDRATA E DISSOLVE

AZIONE FUNGICIDA

PREV-AM plus provoca il disseccamento diretto e immediato delle infezioni fungine (dissolvimento miceli, sporangi, conidi)




1

Azione diretta su funghi patogeni e fitofagi



2

Migliora l'assorbimento delle molecole sistemiche o citotropiche




3

Copertura più omogenea sulla vegetazione, effetto bagnante

AZIONE INSETTICIDA

PREV-AM plus provoca una forte disidratazione e il disseccamento degli insetti a corpo molle (come mosche bianche, tripidi e cicaline)





Potatura



Apertura
gemme



Foglie
distese



Grappoli
separati



Bottoni fiorali



Fioritura



Allegagione



Acino grano
di pepe



Accrescimento
acini



Pre-chiusura



grappolo
chiuso



Invaiaatura



Maturazione/
Pre-raccolta



Post-raccolta

INDUZIONE DI RESISTENZA



14-20 giorni



14-20 giorni



OIDIO



da solo 300-400 ml/hl
con 400-500 l/ha di acqua



*

300-400 ml/hl
localizzato ai grappoli con
400-500 l/ha di acqua



*

250-160 ml/hl con 600-1000 l/ha di acqua in miscela
con Zolfi a dosi ridotte (200 gr/hl (max 2 Kg/ha))
o antiodici non curativi/eradicanti



*

250-160 ml/hl
con 600-1000 l/ha di
acqua in miscela con
Zolfi a dosi ridotte (max
200 g/hl)



* Efficace anche con sporulazione in atto.

PERONOSPORA



In agricoltura convenzionale:
effetto SINERGICO e COMPLEMENTARE con fitofarmaci sistemici

DISIDRATA E DISSOLVE




— Insetticida o fungicida sist.



Insetti a corpo
molle
(es. Mosche
bianche, Tripidi,
Cicaline, ecc)



Patogeni
(es. Oidio e
Peronospora
già presenti sui
vegetali)



NOTE TECNICHE

- Non miscelare PREV-AM® PLUS con bagnanti, coadiuvanti, olii estivi, amminoacidi, acidi umici e fulvici e preparati contenenti estratti di alghe
- Non utilizzare PREV-AM® PLUS con dosaggi di zolfo bagnabile superiori a 2 kg/ha
- Distanziare di almeno 5-7 giorni l'intervento polverulento di zolfo da applicazioni di PREV-AM® PLUS
- Distanziare di almeno 8-10 gg l'applicazione di PREV-AM PLUS® da un eventuale intervento polverulento di zolfo.
- Nel caso di PREV-AM® PLUS in miscela con rameici, applicare al massimo 500-600 g/ha di rame metallo (sono preferibili i sali da solfato, solfato tribasico e ossicloruro)
- Su uva da tavola applicare PREV-AM® PLUS al massimo fino alla fine della fioritura
- Con PREV-AM® PLUS si consiglia di utilizzare un antischiumogeno