


# DEDALUS® 25 WDG

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

COMPOSIZIONE
Tebuconazolo puro 25 %

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP	
N° 15307 del 15-03-2012	WG Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)	Può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.		400	0,5 kg	<div></div> <div>ATTENZIONE</div> <div>H302, H361d, H410, EUH401</div>	
BUFFER ZONE		GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO		TITOLARE REGISTRAZIONE
—		3	3077	9	Nufarm		Nufarm Italia S.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Pomacee (Melo e Pero)	Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> spp.)	40-50 g/hl max 0,75 kg/ha (1400-1500 l/ha d'acqua)	In miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluamide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. È possibile impiegare Dedalus 25 WDG con effetto curativo trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.	14 gg	3
	Oidio o Mal bianco ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )				
	Maculatura bruna del Pero ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	50 g/hl max 0,75 kg/ha (1400-1500 l/ha d'acqua)			
Drupacee (Pesco e Nettare, Albicocco, Ciliegio, Susino)	Monilia ( <i>Monilia</i> spp.) e Botrite	50-75 g/hl max 1,125 kg/ha (Pesco, Nettare Susino 1000-1500 l/ha d'acqua Albicocco, Ciliegio 1200-1500 l/ha d'acqua)	Interventi: - a cavallo della fioritura; - in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni.	7 gg	2
	Mal bianco ( <i>Sphaerotheca</i> spp.)				
	Ruggine del Susino ( <i>Tranzschelia</i> spp.)	50 g/hl (1000-1500 l/ha d'acqua) max 1,125 kg/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.		
Vite (da vino e da tavola)	Oidio ( <i>Uncinula necator</i> )	40 g/hl max 0,4 kg/ha (1000 l/ha d'acqua)	Ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.).	14 gg	3
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchini, Pomodoro, Peperone, Carciofo	Oidio	50 g/hl max 0,5 kg/ha (800-1000 l/ha d'acqua)	Trattare ogni 7-10 giorni. Su melone, cetriolo, zucchini, pomodoro applicazioni consentite sia in pieno campo che in serra. Su cocomero applicazioni consentite solo in pieno campo.	3 gg Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchini 7 gg Carciofo, Cocomero, Melone	4
Frumento, Orzo	Mal del piede	1,0 kg/ha (600-800 l/ha d'acqua)	In fase di accestimento-levata	30 gg	1
	Oidio, Ruggini ( <i>Puccinia</i> spp.), Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium</i> spp.), Elmintosporiosi ( <i>Pyrenophora teres</i> ), Septoria ( <i>Septoria</i> spp.)		Dalla fase di inizio levata alla spigatura.		
	Fusariosi della spiga ( <i>Fusarium</i> spp.)		In fase di piena fioritura.		
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> , <i>Sclerotinia homeocarpa</i> , <i>Rizoctonia solani</i>	1,5-2,0 g per 10 m² (1,5-2,0 kg/ha)	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. È obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.	—	2

PHI: Tempo di carenza

**Indicazioni per il corretto impiego** - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Evitare che le donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)