

EFUZIN® 400 SC

FUNGICIDA ENDOTERAPICO TRANSLAMINARE E DI CONTATTO
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE
Dodina pura 39,4 % (= 400 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 12625 del 30-06-2005	SC Sospensione concentrata	Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, con dimetoato, con concimi fogliari minerali o a base di acidi umici. Miscele con formulati in emulsione concentrata o con olii minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità e a fenomeni di sensibilizzazione delle colture.	480 800	1 L 5 L	<div> PERICOLO H315, H318, H331, H410, EUH401</div>
BUFFER ZONE	GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
12 m dalle acque superficiali per Pomacee/drupacee - 5 m per Olivo - 12,5 m per Pioppo (piante adulte) - 30 m Pioppo (piante giovani, 3 m altezza)	U 12	2902	6.1	UPL	Arysta LifeScience Benelux SPRL

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	80-100 ml/hl	Trattamenti preventivi.	40 gg	1-2
		100-120 ml/hl	Trattamenti curativi.		
Ciliegio	Antracnosi (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), Cilindrosporiosi del ciliegio (<i>Cylindrosporium padi</i>). Azione collaterale contro Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>), Moniliosi (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Monilia laxa</i>)	100-120 ml/hl	Trattamenti preventivi.	14 gg	1-2
Pesce, Nettare	Bolla del pesco (<i>Taphrina deformans</i>), Corineo (<i>Stigmina carpophila</i>), Cancro rameale (<i>Fusicoccum amygdali</i>), Seccume dei rami (<i>Cytospora cincta</i>)	150 ml/hl	Trattamenti al bruno (caduta foglie e inizio rigonfiamento gemme).	75 gg	1-2
		100 ml/hl	Trattamenti in vegetazione.		
	Moniliosi (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Monilia laxa</i>)	100-150 ml/hl	Trattamenti durante le fasi di fioritura-caduta petali.		
Olivo (da tavola e da olio)	Occhio di pavone (<i>Cycloconium oleaginum</i>), Antracnosi dell'olivo (<i>Gloeosporium olivarum</i>)	100-170 ml/hl	Effettuare 1-2 interventi ad intervallo di 7 giorni: - dallo sviluppo fogliare sino all'inizio della fioritura - Autunnale. Per olivo da tavola, utilizzare solo in post-raccolta. Non distribuire più di 2,25 L di prodotto per ettaro per trattamento, corrispondente a 900 g di dodina, in 1000 L di acqua. In caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione d'impiego in modo da mantenere costante la quantità distribuita per ettaro. Non trattare in fioritura.	7 gg	1-2
Pioppo	<i>Marssonina brunea</i>	80-100 ml/hl	Trattamenti preventivi.	—	2
		120-150 ml/hl	Trattamenti curativi.		

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Non trattare con acqua fredda e con temperature esterne prossime a 0°C. In particolari condizioni il prodotto può provocare rugginosità su mele Golden Delicious se impiegato prima dello stadio di frutto noce (BBCH 72-74).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali come indicato di seguito. - Pomacee/drupacee (680 g dodina/ha): 12 m o applicare una riduzione totale della deriva del 90% - Olivo (900 g dodina/ha): 5 m o applicare una riduzione totale della deriva del 30% - Pioppo (piante adulte): 12,5 m o 9 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% - Pioppo (piante giovani, 3 m altezza): 30 m o 9 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva dell'80% o 9 m utilizzando una riduzione del 60% del flusso d'aria o 7 m utilizzando una riduzione del 60% del flusso d'aria con ugelli con riduzione della deriva dell'80% o applicare una riduzione totale della deriva del 90%.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)