

# MOXYL® 45 WG

COMPOSIZIONE

Cymoxanil puro 45 %

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 15048 del 25-03-2011	WG Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)	Compatibile con i prodotti fitosanitari contenenti mancozeb, maneb, metiram, folpet e con le Poltiglie Bordolessi di origine UPL Europe Ltd., alle concentrazioni d'uso raccomandate.	360	1 kg	<div></div> <div>ATTENZIONE</div> <div>H302, H361fd, H373, H410, EUH208, EUH401</div>
BUFFER ZONE	GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
—	27	3077	9	Sumitomo Chemical Italia	UPL Europe Ltd.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Vite (da vino e da tavola)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	270 g/ha (200-1000 l/ha d'acqua)	Moxyl 45 WG può essere applicato dalla fase di 3-4 foglie vere all'invaiatura intervenendo con criterio preventivo ed osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni. Impiegare in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 l/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. Su uva da vino Moxyl 45 WG non ha effetti indesiderati sui processi di vinificazione e non altera le proprietà organolettiche del vino. Impiegare il prodotto in miscele con antiperonosporici di copertura multisito.	28 gg	4
Pomodoro (in campo)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	220 g/ha (200-1000 l/ha d'acqua)	Moxyl 45 WG può essere applicato dalla fase di 3-4 foglie vere fino alla maturazione dei frutti, osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni. Impiegare in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 l/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. Si consiglia di impiegare il prodotto in associazione e/o alternanza con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.	3 gg Pomodoro da mensa 10 gg Pomodoro da industria	5
Patata	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	270 g/ha (200-1000 l/ha d'acqua)	Moxyl 45 WG può essere applicato dalla comparsa del primo getto basale laterale fino al 50% di foglie brunastre, osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni. Impiegare in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 l/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. Si consiglia di impiegare il prodotto in associazione e/o alternanza con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.	7 gg	6

PHI: Tempo di carenza

**Indicazioni per il corretto impiego** - Moxyl 45 WG esplica attività preventiva, curativa ed eradicante (potendo controllare infezioni già in atto) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stato fenologico e di sviluppo delle colture. È sempre consigliabile applicare Moxyl 45 WG in miscela con prodotti di contatto e/o endoterapici a diverso meccanismo e modalità d'azione. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza deve sempre essere impiegato in via preventiva. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture trattate prima che siano trascorsi almeno due giorni dall'ultima applicazione.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)