

ORIOUS® P

FUNGICIDA SISTEMICO-TRANSLAMINARE PER CEREALI
(FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE)

COMPOSIZIONE

Tebuconazolo puro 12,3 %
(= 133 g/l)
Procloraz puro 24,6 %
(= 267 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 13913 del 02-10-2014	EW Emulsione olio/acqua	Non deve essere miscelato con preparati alcalini che potrebbero ridurre la sua attività.		600	5 L	 ATTENZIONE H302, H319, H361d, H410, EUH208, EUH401
BUFFER ZONE		GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	
5 m da corpi idrici superficiali nei terreni in piano - 20 m nei terreni in pendio per i cereali vernini - 10 m nei terreni in pendio per i cereali primaverili		3	3082	9	Nufarm	Nufarm Italia S.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Segale	<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> , <i>Ophiobolus graminis</i> , oidio (<i>Erysiphe graminis</i>), ruggini (<i>Puccinia</i> spp.), Elmintosporiosi (<i>Pyrenophora teres</i> ed altri agenti), <i>Rhynchosporium secalis</i>	1,2 l/ha (300-400 l/ha d'acqua)	Applicare tra inizio levata e completa spigatura. Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di trattamento di 14 giorni.	28 gg	2
Frumento tenero e duro	Septoria, <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> , <i>Ophiobolus graminis</i> , oidio (<i>Erysiphe graminis</i>), ruggini (<i>Puccinia</i> spp.), <i>Fusarium</i> spp.	1,7 l/ha (300-400 l/ha d'acqua)	Applicare tra inizio levata e fine fioritura. Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di trattamento di 14 giorni.	28 gg	2
Triticale	Septoria, oidio (<i>Erysiphe graminis</i>), ruggini (<i>Puccinia</i> spp.)	1,5 l/ha (100-300 l/ha d'acqua)	Applicare tra inizio levata e completa spigatura. Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di trattamento di 14 giorni.	28 gg	2

Il foraggio dei cereali trattati con questo prodotto non deve essere utilizzato per l'alimentazione animale

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Agisce per via preventiva e curativa e si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni del piede e della parte aerea del frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale. Si raccomanda di usare la miscela immediatamente dopo la preparazione e mantenendo una agitazione continua.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici - nei terreni in piano (pendenza inferiore al 3%) rispettare una fascia di sicurezza di 5 m da corpi idrici superficiali; - nei terreni in pendio (pendenza superiore al 3%): per i cereali vernini rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, applicare con una riduzione della deriva pari al 99% e del ruscellamento pari all'80%; per i cereali primaverili rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 10 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, applicare con una riduzione della deriva pari al 99% e del ruscellamento pari al 60%. Durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto indossare guanti. Durante l'applicazione indossare guanti, calzature robuste ed indumenti protettivi. Non rientrare nell'area trattata se non a vegetazione completamente asciutta. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha di procloraz per ogni applicazione.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni