

SAKURA®

FUNGICIDA PER FRUMENTO

COMPOSIZIONE

Bromuconazolo puro 15,86%
(= 167 g/l)
Tebuconazolo puro 10,17%
(= 107 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 15199 del 20-03-2013	EC Emulsione concentrata	In caso di miscela con altri formulati, rispettare il periodo di carenza più lungo.		720 800	1 L 5 L	
BUFFER ZONE		GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
—		3	3082	9	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Nufarm Italia S.r.l.
						PERICOLO H304, H318, H336, H361d, H410, EUH401

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Frumento (duro e tenero)	Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.), Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.), Septoria (<i>Septoria</i> spp.)	1,2 l/ha	Posizionare l'applicazione da inizio levata alla fioritura. Contro la fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.) il trattamento andrà effettuato dalla fine della spigatura alla fioritura. Usare il prodotto una sola volta per anno sospendendo il trattamento all'inizio della fioritura.	—	1

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni