

# ANTHEM EKO

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro  
40 % (400 g/l)

REGISTRAZIONE		FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N. 17094 del 2-11-2017		SC Sospensione concentrata	In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.		396 600	1L 5L	<div></div> <div>ATTENZIONE</div> <div>H410, EUH208, EUH401</div>
BUFFER ZONE		GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE	
Per proteggere le specie acquatiche non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni su vite, 20 metri su agrumi, pomacee e drupacee, 10 metri per le altre colture		K1	3082	9	ADAMA ITALIA S.r.l.	ADAMA ITALIA S.r.l.	

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Agrumi, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo), Drupacee (Pesco, Nettareino, Albicocco, Ciliegio, Susino)	<b>GRAMINACEE:</b> <i>Digitaria sanguinalis</i> (sanguinella), <i>Echinochloa crusgalli</i> (giavone comune), <i>Lolium spp.</i> (loiutto), <i>Phalaris spp.</i> (falaride), <i>Poa annua</i> (fienarola), <i>Setaria spp.</i> (pabbio).  <b>DICOTILEDONI:</b> <i>Amaranthus spp.</i> (amaranto), <i>Anagallis arvensis</i> (anagallide), <i>Chenopodium spp.</i> (farinello), <i>Chrysanthemum segetum</i> (crisantemo), <i>Diploaxis erucoides</i> (ruchetta), <i>Fumaria officinalis</i> (fumaria), <i>Lactuca serriola</i> (lattuga selvatica), <i>Matricaria spp.</i> (camomilla), <i>Papaver rhoeas</i> (papavero), <i>Picris echioides</i> (aspraggine), <i>Polygonum spp.</i> (poligoni), <i>Portulaca oleracea</i> (porcellana comune), <i>Sinapis spp.</i> (senape), <i>Solanum nigrum</i> (erba morella), <i>Sonchus spp.</i> (grespino), <i>Veronica spp.</i> (veronica).	3 l/ha	Da post-raccolta fino a inizio fioritura.	—	1
Vite (uve da vino e da tavola)		3 l/ha	Da post-raccolta fino a ripresa vegetativa.	—	
Fragola		3 l/ha	In pre-trapianto o in posttrapianto tra le file.	—	
Aglio		3 l/ha	In pre-emergenza o postemergenza (1-3 foglie).	—	
Carciofo		2.5 l/ha	In pre-emergenza o pericaccio.	90 gg	
Cavoli (Cavoli a testa, Cavoli a infiorescenza, Cavoletti di Bruxelles)		2,5 l/ha	In pre-trapianto.	90 gg	
Cipolla		2,5 l/ha	In pre-emergenza o pretrapianto.	—	
Cotone		3 l/ha	In pre-emergenza o presemina.	—	
Fumento, orzo		3 l/ha		—	
Girasole		3 l/ha		—	
Leguminose da granella (Fagioli e Fagiolini, Piselli)		3 l/ha		—	
Piselli per il consumo fresco		3 l/ha	In preemergenza.	—	
Mais		3 l/ha	In pre-emergenza o postemergenza (1-3 foglie).	—	
Patata		3 l/ha		—	
Peperone		3 l/ha	In pre-trapianto	—	
Pomodoro		2,5 l/ha	In pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.	—	
Sedano		2,5 l/ha	In pre-trapianto.	90 gg	
Soia		3 l/ha	In pre-semina.	—	
Tabacco		3 l/ha	In pre-trapianto o in posttrapianto tra le file.	21 gg	

PHI: Tempo di carenza  
**Indicazioni per il corretto impiego** - Distribuire il prodotto mediante applicazione al suolo con attrezzatura a bassa pressione alle dosi specificate per ciascuna coltura e con un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha. Si raccomanda di impiegare la dose alta in suoli argillosi o con elevato tenore in sostanza organica e la dose più bassa in terreni leggeri. Effettuare una sola applicazione per ciclo colturale facendo seguire all'applicazione una irrigazione, se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento, o una lavorazione meccanica al fine di incorporare il prodotto nel terreno.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.