



U 46[®] M CLASS

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI, RISO, MAIS,
MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO

COMPOSIZIONE

MCPA puro
(da sale dimetilamminico)
19,01 % (= 200 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 3343 del 08-02-1980	SL Liquido (concentrato) solubile in acqua	In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.		800	5 L	<div></div> <div>PERICOLO</div>
BUFFER ZONE		GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
5 m dai corpi idrici superficiali - 5 m dalla zona non coltivata		O	3082	9	Nufarm	Nufarm Italia S.r.l.
						H302, H315, H318, H411, EUH401

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Cereali (Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena)	Mestoloaccio lanceolato (<i>Alisma plantago</i>), Amaranto comune (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Farinaccio (<i>Chenopodium album</i>), Stoppione (<i>Cirsium arvense</i>), Vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>), Zigolo delle risaie (<i>Cyperus difformis</i>), Rucola selvatica (<i>Diplotaxis erucoides</i>), Fumaria comune (<i>Fumaria officinalis</i>), Geranio (<i>Geranium dissectum</i>), Papavero (<i>Papaver rhoeas</i>), Correggiola (<i>Polygonum aviculare</i>), Ravanello selvatico (<i>Raphanus raphanistrum</i>), Soffione (<i>Taraxacum officinale</i>), Colza (<i>Brassica napus</i>) PHI: Tempo di carenza	4-5 l/ha	Il trattamento si effettua tra l'accestimento e l'inizio della levata. La dose minore è consigliata su infestanti ai primi stadi di sviluppo.	70 gg	1
Riso		1,5 l/ha	Il trattamento si effettua non prima dell'emissione della quinta foglia fino allo stadio di botticella. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti sono nei primi stadi di sviluppo. Prima del trattamento occorre abbassare il più possibile il livello dell'acqua per fare emergere le infestanti senza arrivare però all'asciutta (almeno 1-2 cm di acqua). Successivamente innalzare il livello dell'acqua non prima che siano trascorse 24 ore dall'intervento.	100 gg	1
Mais		0,8 - 1 l/ha	Il trattamento si effettua quando la coltura è allo stadio di 4 foglie.	70 gg	1
Agrumi, Olivo, Melo, Pero		6 l/ha	Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma indiretta, con la coltura. Per le applicazioni su olivo, evitare di trattare all'epoca della caduta delle olive. In caso di applicazioni localizzate (sotto chioma, sulla fila ecc.) adattare la dose alla superficie effettivamente trattata.	80 gg	1

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Si consiglia di effettuare il trattamento con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12 °C. Utilizzare 200-400 litri di acqua per ettaro con attrezzatura a bassa pressione. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari. Durante la miscela, il carico, l'applicazione ed il lavaggio dell'attrezzatura, indossare guanti per protezione chimica, occhiali, maschera o visiera facciale. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non coltivata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 152/2006. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.