

DIABLO SC

ACARICIDA OVO-LARVICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
PER LA LOTTA CONTRO GLI ACARI FITOFAGI

COMPOSIZIONE
Exitiazox puro 24 % (= 258,7 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE		MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N. 15713 del 18-12-2013	SC Sospensione concentrata		Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini.		384	0,2 L	
BUFFER ZONE		GRUPPO IRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE	
10 metri da corpi idrici superficiali per agrumi e vite nelle applicazioni tardive - 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci - 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.		10A	3082	9	Industrias Afrasa S.A.	Industrias Afrasa S.A.	
H411, EUH208, EUH401							

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Agrumi (Pompelmo, Tangelo Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola)	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>), Ragnetti gialli (<i>Eotetranychus carpini</i>)	4-6 ml/hl in 1000-2500 l/ha d'acqua (max 40-150 ml/ha)	Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando una sola applicazione per stagione.	14 gg	1
Vite	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i>)	20-30 ml/hl, in 500-1000 l/ha d'acqua (max 100-300 ml/ha)	Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando una sola applicazione per stagione.	21 gg	1
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo)	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i>)	20-30 ml/hl in 800-1000 l/ha d'acqua (max 160-300 ml/ha)	Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando una sola applicazione per stagione.	28 gg	1
Floreali, Ornamentali (campo e serra)	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/hl in 500-1000 l/ha d'acqua (max 100-200 ml/ha)	Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando una sola applicazione per stagione. Per ottenere una più completa efficacia del prodotto si consiglia di bagnare abbondantemente la vegetazione con un sufficiente quantitativo di acqua per ettaro.	—	1

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto possiede un'azione traslaminare nelle foglie ed agisce per contatto sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi e di quelli gialli.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri per agrumi e vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)