

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. E' obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

BANVEL® 480 S

ERBICIDA SELETTIVO IN SOLUZIONE ACQUOSA PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE DICOTILEDONI E MONOCOTILEDONI NEI CEREALI (MAIS, FRUMENTO, SORGO) E STOPPIE

COMPOSIZIONE

Dicamba puro
41 % (= 480 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ		PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N. 8617 del 23-12-1994	SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua	In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.		600	1L	<div></div> <div>ATTENZIONE</div> <div>H319, H411, EUH401</div>
BUFFER ZONE		GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare			3082	9	Syngenta Italia S.p.A.	Syngenta Italia S.p.A.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Mais	Infestanti sensibili. Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>), Amaranti (<i>Amaranthus</i> spp.), Forbicina (<i>Bidens</i> spp.), Vilucchione (<i>Calystegia sepium</i>), Fiordaliso (<i>Centaurea cyanus</i>), Farinello (<i>Chenopodium album</i>), Stoppione (<i>Cirsium arvense</i>), Vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>), Stramonio (<i>Datura stramonium</i>), Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>), Attaccamano (<i>Galium aparine</i>), Uva turca (<i>Phytolacca decandra</i>), Correggiola (<i>Polygonum aviculare</i>), Persicaria (<i>Polygonum persicaria</i>), Convolvolo nero (<i>Fallopia convolvulus</i>), Romice (<i>Rumex</i> spp.), Sicio (<i>Sicyos angulatus</i>), Senecione (<i>Senecio vulgaris</i>), Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>), Spergola (<i>Spergula arvensis</i>), Centocchio (<i>Stellaria media</i>), Soffione (<i>Taraxacum officinalis</i>), Vecce (<i>Vicia</i> spp.), Nappola italiana (<i>Xanthium</i> spp.). Infestanti mediamente sensibili: Anagallide (<i>Anagallis arvensis</i>), Borsa del pastore (<i>Capsella bursa pastoris</i>), Camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), Crisantemo selvatico (<i>Chrysanthemum segetum</i>), Cocomero asinino (<i>Ecballium elaterium</i>), Papaveri (<i>Papaver</i> spp.), Ravanello selvatico (<i>Raphanus raphanistrum</i>), Senape comune (<i>Sinapis arvensis</i>), Ortica (<i>Urtica urens</i>), Veronica (<i>Veronica</i> spp.).	0,3-0,6 l/ha	Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza del mais dallo stadio da 2 fino a 8 foglie. Prima di applicare sulle linee pure di mais, da solo o in miscela con altri prodotti, eseguire prove di selettività su alcune piante prima di estendere l'applicazione sull'intero appezzamento. Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di Mais dolce. Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico per la coltura.	-	-
Sorgo da granella		0,35-0,44 l/ ha	Epoca: in post-emergenza prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5° foglia. In caso di impiego su nuove varietà controllare preventivamente la selettività.		
Frumento (incluso frumento duro)		0,25 l/ha	Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza della coltura dallo stadio di 4-5 foglie fino all'inizio della levata.		
Stoppie		0,6 l/ha	Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza delle infestanti dicotiledoni annuali e perennanti.		

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - BANVEL 480 S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni