

MYSTIC® 25 WG

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO),
DRUPACEE (PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, SUSINO),
VITE DA VINO, CEREALI (GRANO E ORZO), TAPPETI ERBOSI

COMPOSIZIONE

Tebuconazolo puro 25 %

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP	
N° 12538 del 03-09-2007	WG Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)	Può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.	420	1 kg	<div> ATTENZIONE H361d, H410, EUH208, EUH401</div>	
BUFFER ZONE		GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
—		3	3077	9	Nufarm	Nufarm Italia S.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Pomacee (Melo, Pero)	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>)	0,05% (50 g/hl d'acqua - max 800 g/ha)	Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione. In miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Interrompere le applicazioni quando il diametro dei frutti ha raggiunto la dimensione di 3,5/4 cm (BBCH75).	60 gg	3
	Mal bianco del melo (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,05-0,08% (50-80 g/hl d'acqua - max 800-1000 g/ha)	Interrompere le applicazioni quando il diametro dei frutti ha raggiunto la dimensione di 3,5/4 cm (BBCH75).		
	Maculatura bruna del pero (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	0,08% (80 g/hl d'acqua - max 1000 g/ha)	Interrompere le applicazioni quando il diametro dei frutti ha raggiunto la dimensione di 3,5/4 cm (BBCH75).		
Drupacee (Albicocco, Pesco, Nettareino, Susino)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>), Moniliosi (<i>Monilia fructigena</i>)	0,05-0,08% (50-80 g/hl d'acqua - max 1000 g/ha)	1-2 trattamenti a cavallo della fioritura. 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni. Per pesco, nettarino e albicocco intervenire due volte sole dopo la scamicatura.	7 gg	3 Susino 2
	Mal bianco (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,05-0,08% (50-80 g/hl d'acqua - max 1000 g/ha)	Per pesco, nettarino e albicocco intervenire due volte sole dopo la scamicatura.		
	Ruggine delle drupacee (<i>Tranzschelia pruni spinosa</i>)	0,05% (50 g/hl d'acqua - max 750 g/ha)	1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Per pesco, nettarino e albicocco intervenire due volte sole dopo la scamicatura.		
Vite da vino	Oidio della vite (<i>Uncinula necator</i>)	0,04% (40 g/hl d'acqua - max 400 g/ha)	Intervenire ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).	30 gg	3
Cereali (Grano, Orzo)	Mal del piede (<i>Ophiobolus graminis</i> , <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	250 g/hl d'acqua (max 1000 g/ha)	In fase di accestimento-levata.	30 gg Orzo 35 gg Grano	Orzo 1 Grano 2
	Oidio dei cereali (<i>Erysiphe graminis</i>), Ruggini dei cereali (<i>Puccinia</i> spp.), Elmintosporiosi (<i>Pyrenophora teres</i>), Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		In fase di inizio levata-spigatura.		
	Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.)		In fase di piena fioritura.		
	Septoria (<i>Septoria</i> spp.)		In fase di inizio levata-spigatura.		
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> , Marciume bruno (<i>Sclerotinia homeocarpa</i>), Rizoctoniosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)	250 g/hl d'acqua (max 1500-2000 g/ha)	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico. In caso d'impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.	—	2

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)