

ALGOR® PLATIN
Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento
(tenero e duro) e l'orzo
Sospensione concentrata (SC)

ALGOR® PLATIN

100 g di prodotto contengono:

Diflufenican 3,4 g (= 40 g/l)
Clortoluron 50,8 g (= 600 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-
isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-
isothiazole-3-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 – Sospettato di provocare il cancro. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Sede amministrativa: Bologna, Via Guelfa, 5
Tel. 051 0394025

Officina di Produzione:

Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne – Gaillon (F);
Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)

Registrazione n° 13104 del Ministero della Salute del
29/03/2011

Contenuto netto: Litri 1 - 5 – 10 - 20

Partita n.: vedere contenitore

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo



ATTENZIONE

contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di sicurezza di 5 metri dalla vegetazione naturale.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali.

NORME PRECUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di esposizione o temuta esposizione, consultare un medico.

In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveneni

Caratteristiche

ALGOR® PLATIN è erbicida specifico per gli impieghi su frumento tenero, frumento duro ed orzo. La formulazione liquida in sospensione concentrata, lo rendono di facile manipolazione e impiego.

I principi attivi contenuti in **ALGOR® PLATIN** (diflufenican e clortoluron) offrono una azione erbicida complementare in grado di controllare le più importanti e diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni delle colture sopra riportate.

Infestanti sensibili:

Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di topo), *Apera spica venti* (Cappellini dei campi), *Lolium multiflorum* (Loglio Italico), *Poa trivialis* (Spannocchina)

Dicotiledoni: *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Cerastium arvense* (Peverina), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Ranunculus spp* (Ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Veronica persica* (Veronica comune), *Viola spp.* (Viola del pensiero).

Infestanti mediamente sensibili

Graminacee *Phalaris brachystachys* e *P. paradoxa* (Falaridi), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana).

Dicotiledoni *Galium aparine* (Attaccamani), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Chrysanthemum segetum* (Crisantemo dei campi), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Galeopsis tetrahit* (Canapa selvatica) e *Polygonum convolvulus* (Convolvolo nero).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

ALGOR® PLATIN può essere applicato sia in pre- che in post-emergenza delle colture e delle infestanti, rispettando le seguenti modalità applicative:

- **In pre-emergenza, litri 2,75 – 3 per ettaro.** Per queste applicazioni, al momento dell'intervento il terreno deve essere ben preparato, livellato e privo di zolle.

Il seme della coltura deve essere ben coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3 - 4 cm).

- **In post-emergenza, litri 2,25 – 2,5 per ettaro.** In questo momento applicativo le infestanti graminacee quali *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana), *Lolium multiflorum* (Loglio italico), *Phalaris brachystachys* e *Phalaris paradoxa* (Falaride), debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.

Per assicurare una buona copertura il prodotto va distribuito con un volume di acqua di 300-500 litri per ettaro.

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale

COMPATIBILITA' – Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA' - Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo. In tutti i casi non si evidenziano tuttavia ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture. Non impiegare il prodotto sulle varietà di frumento Kid, Demar 4, Etecho, Tremie, Marvao, Giava, Tibet, Acril, Aubusson, Kalango e Premio.

Sospendere il trattamento 84 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA: Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti. Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale. Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO E L'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO