



# ERBITOX<sup>®</sup> SUPREME

●●● RESISTANCE BREAKER ●●●

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  ATTENZIONE		<b>Confezioni</b> 1 L 
<b>Frasi H</b> H315, H317, H411, EUH401		
<b>Gruppo HRAC</b> 0	<b>Marchio registrato</b> Sumitomo Chemical Italia	<b>Titolare registrazione</b> Nufarm Italia Srl
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3082	<b>Classificazione ADR</b> 9

**Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena e mais**

**Composizione:** 2,4-D estere sotto forma di 2-etilesilestere 81,7 g (= 905 g/l)

**Miscibilità:** Non compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**Registrazione:** N° 16574 del 16-02-2016

**Formulazione:** SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua



## Avversità controllate

### Infestanti annuali:

centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), margherita (*Bellis perennis*), borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), farinello comune (*Chenopodium album*), fumaria (*Fumaria officinalis*), papavero comune (*Papaver rhoeas*), poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), ranuncolo strisciante (*Ranunculus repens*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*), centocchio (*Stellaria media*), porcellana (*Portulaca oleracea*), veronica comune (*Veronica persica*)

### Infestanti perennanti:

vilucchio (*Convolvulus arvensis*), stoppione (*Cirsium arvense*), romice (*Rumex* sp.), soffione (*Taraxacum officinale*), ortica comune (*Urtica dioica*)

## Culture (intervallo sicurezza)

## Dosi

## Modalità d'impiego

Frumento tenero e duro, orzo, segale, avena

0,45 - 1,00 l/ha

Applicare in post-emergenza. La dose inferiore potrà essere utilizzata nelle fasi di sviluppo iniziali delle infestanti. Distribuire il prodotto tra la fase di accestimento ed inizio levata, entro il secondo nodo del cereale.

Mais

0,25 - 1,00 l/ha

Applicare in post-emergenza entro lo stadio di 6 foglie. Dosare secondo la specie infestante da colpire e lo stadio vegetativo. Non applicare oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Eseguire il trattamento bagnando uniformemente le infestanti utilizzando 300-400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate. Non applicare il prodotto se le temperature notturne sono basse, se sono imminenti gelate o in periodi prolungati di tempo freddo. Per tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento l'anno. Erbitox Supreme può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, in particolare vite, alberi da frutta ed ortaggi. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.