



Indicazioni di pericolo CLP  ATTENZIONE Frasi H H315, H319, H410, EUH401		Confezioni 0,225 kg 
Gruppo HRAC B/F1	Marchio registrato Nufarm Italia Srl	Titolare registrazione Nufarm Italia Srl
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3077	Classificazione ADR 9

Erbicida per cereali in granuli idrodispersibili

Caratteristiche: Alliance è un erbicida specifico per il diserbo in post-emergenza dei cereali contro le infestanti a foglia larga. Alliance si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di inizio levata. Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione è effettuata quando le malerbe sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita.

Composizione: Diflufenican 60% - Metsulfuron metile 6%

Miscibilità: Alliance è compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sui cereali: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

Registrazione: N° 13171 del 25-11-2014

Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)



Culture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Frumento duro e tenero invernale, Orzo invernale, Segale invernale, Triticale	Infestanti sensibili Centocchio (<i>Stellaria media</i>), Senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>), Viola (<i>Viola tricolor</i>), Camomilla (<i>Matricaria chamomilla</i>), Falsa ortica (<i>Lamium purpureum</i>), Erba brusca (<i>Rumex acetosella</i>), Miagro peloso (<i>Rapistrum rugosum</i>) Infestanti mediamente sensibili Papavero (<i>Papaver rhoeas</i>), Veronica (<i>Veronica</i> sp.)	75 g/ha	Intervenire in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di inizio levata. Numero di trattamenti:1.

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In applicazioni tardive (levata avanzata) su frumento duro, si possono verificare temporanei e lievi imbianchimenti fogliari, che non producono alcun effetto sulle potenzialità della coltura. Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente, non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo aratura profonda, è possibile seminare soia e mais in secondo raccolto. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata.