



Erbicida per cereali in granuli idrodispersibili



Caratteristiche: Alliance è un erbicida specifico per il diserbo in post-emergenza dei cereali contro le infestanti a foglia larga. Alliance si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di inizio levata. Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione è effettuata quando le malerbe sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita.

Composizione: Diflufenican 60% - Metsulfuron metile 6%

Miscibilità: Alliance è compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sui cereali: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

Registrazione: N° 13171 del 25-11-2014

Formulazione: WG - Granuli dispersibili in acqua (anche DG e DF)

Indicazioni di pericolo CLP  ATTENZIONE Frasi H H315, H319, H410, EUH401		Confezioni 0,225 kg 
Gruppo HRAC B/F1	Marchio registrato Nufarm Italia Srl	Titolare registrazione Nufarm Italia Srl
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3077	Classificazione ADR 9

Culture (intervallo di sicurezza)

Frumento duro e tenero invernale, Orzo invernale, Segale invernale, Triticale

Avversità controllate

Infestanti sensibili

Centocchio (*Stellaria media*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Viola (*Viola tricolor*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Erba brusca (*Rumex acetosella*), Miagro peloso (*Rapistrum rugosum*)

Infestanti mediamente sensibili

Papavero (*Papaver rhoeas*), Veronica (*Veronica* sp.)

Dosi

75 g/ha

Modalità d'impiego

Intervenire in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di inizio levata.
Numero di trattamenti: 1.

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In applicazioni tardive (levata avanzata) su frumento duro, si possono verificare temporanei e lievi imbianchimenti fogliari, che non producono alcun effetto sulle potenzialità della coltura. Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente, non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo aratura profonda, è possibile seminare soia e mais in secondo raccolto. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata.