



**Erbicida graminicida selettivo per barbabietola da zucchero e da foraggio, pomodoro e soia**

**Caratteristiche:** Prodotto graminicida di post emergenza efficace sulle principali infestanti graminacee.

**Composizione:** Clethodim puro 25 g (240 g/l)

**Miscibilità:** Si consiglia di utilizzare il prodotto da solo.

**Registrazione:** N° 8796 del 06-03-1996

**Formulazione:** EC - Emulsione concentrata

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>PERICOLO</b> <b>Frasi H</b> H304, H317, H319, H336, H411, EUH066, EUH208, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 L 
<b>Gruppo HRAC</b> A	<b>Marchio registrato</b> Arysta Lifesciences S.A.S.	<b>Titolare registrazione</b> Arysta Lifesciences S.A.S.
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3082	<b>Classificazione ADR</b> 9

Culture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Pomodoro (30 giorni)	Sorgo volgare o sorghetta ( <i>Sorghum halepense</i> ) sia da rizoma sia da seme, Giavone ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Setaria ( <i>Setaria</i> sp.), Avena selvatica ( <i>Avena</i> sp.), Sanguinella ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), Loglio ( <i>Lolium</i> sp.), Coda di volpe ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), Scagliola o falaride ( <i>Phalaris</i> sp.), Giavone americano ( <i>Panicum dichotomiflorum</i> ), Fienarola ( <i>Poa</i> sp.), ricacci di frumento ( <i>Triticum</i> sp.) ed orzo ( <i>Hordeum</i> sp.)	0,6 l/ha	Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accostamento. Contro il <i>Sorghum halepense</i> da rizoma è consigliabile un doppio intervento (0,6 + 0,6); il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.
Soia, Barbabietola da zucchero e da foraggio (60 giorni)	Sorgo volgare o sorghetta ( <i>Sorghum halepense</i> ) sia da rizoma sia da seme, Giavone ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Setaria ( <i>Setaria</i> sp.), Avena selvatica ( <i>Avena</i> sp.), Sanguinella ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), Loglio ( <i>Lolium</i> sp.), Coda di volpe ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), Scagliola o falaride ( <i>Phalaris</i> sp.), Giavone americano ( <i>Panicum dichotomiflorum</i> ), Fienarola ( <i>Poa</i> sp.), ricacci di frumento ( <i>Triticum</i> sp.) ed orzo ( <i>Hordeum</i> sp.)	0,6 l/ha	Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accostamento. Contro il <i>Sorghum halepense</i> da rizoma è consigliabile un doppio intervento (0,6 + 0,6); il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Select svolge una maggior efficacia con l'aggiunta di un bagnante. Non usare Select in previsione di un'imminente pioggia.