

Solicitor 400 SC

Indicazioni di pericolo CLP ATTENZIONE		Confezioni 1 L
Frasi H H351, H411, EUH208, EUH401		
Gruppo HRAC K1	Marchio registrato -	Titolare registrazione Chemnova Agro Italia Srl
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3082	Classificazione ADR 9

Erbicida selettivo per colza e insalate

Caratteristiche: Solicitor 400 SC è un erbicida selettivo in sospensione concentrata che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Sulle malerbe sensibili, i sintomi appaiono dopo 3-4 giorni, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

Composizione: Propizamide 400 g/l

Miscibilità: Il prodotto si impiega da solo.

Registrazione: N° 16547 del 11-01-2016

Formulazione: SC-Sospensione concentrata



Avversità controllate

Infestanti sensibili

Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Avena* sp. (avena selvatica), *Bromus* sp. (forasacco), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Lolium* sp. (loietto), *Poa* sp. (fienarola), *Setaria* sp. (falso panico), tutte le principali graminacee annuali in genere, alcune graminacee poliennali nelle applicazioni autunno-invernali, *Chenopodium album* (farinello comune), *Cuscuta* sp. (cuscuta), *Stellaria media* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica* sp. (Veronica)

Infestanti mediamente sensibili

Amaranthus sp. (amaranto comune), *Echinochloa crus-galli* (giavone)

Culture (intervallo sicurezza)

Dosi

Modalità d'impiego

Colza (180 giorni)

1,00-1,75 l/ha

Impiegare in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie vere. Distribuire il prodotto con 200-500 litri di acqua per ettaro.

Lattughe, Insalate (dolcetta, lattuga cappuccina, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana, scarola, cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero, barbarea, dente di leone, valerianella), Brassicacee Escluse Baby Leaf (30 giorni)

1,75-3,75 l/ha

Impiegare in pre-semina o in pre-trapianto della coltura, prima dell'emergenza delle infestanti. È necessario provvedere ad un leggero interrimento del prodotto dopo l'applicazione. Solicitor 400 SC può essere applicato anche in post-semina, entro 15 giorni dalla messa a dimora, o in post-trapianto, con la coltura non oltre lo stadio delle 4-6 foglie. Le applicazioni su infestanti già emerse sono consigliate solo nel periodo autunno invernale e su terreni ricchi di umidità. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 300 e i 500 litri per ettaro. Su Scarola aumentare eventualmente il volume fino a 600 litri per ettaro.

CONSENTITO MASSIMO 1 TRATTAMENTO IN CAMPO.

Non trattare le Baby Leaf.

Indicazioni per il corretto impiego - Su tutte le colture Solicitor 400 SC può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. È necessario inoltre rispettare gli intervalli sotto indicati tra l'applicazione di Solicitor 400 SC e la successiva semina o trapianto di alcune colture: - 2 mesi per le colture moderatamente tolleranti quali mais, sorgo, fragola, patata dolce, crucifere in genere - 4 mesi per le colture mediamente sensibili quali melanzana, peperone, pomodoro, patata, spinacio, aglio, cipolla, barbabietola da zucchero, menta - 6 mesi per le colture molto sensibili quali frumento, orzo, segale, avena, triticale e graminacee foraggere. Prima dell'impianti di queste colture effettuare una profonda lavorazione del terreno.