



# U 46® D FLUID

RESISTANCE BREAKER

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>PERICOLO</b> <b>Frasi H</b> H318, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 L 
<b>Gruppo HRAC</b> 0	<b>Marchio registrato</b> Gruppo Nufarm	<b>Titolare registrazione</b> Nufarm B.V.
<b>Gruppo imballaggio</b> -	<b>Trasporto ONU</b> -	<b>Classificazione ADR</b> -

**Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale**

**Caratteristiche:** U 46 D Fluid è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

**Composizione:** 2,4 D sale dimetilamminico 59,9 g (= 720g/l) pari a 49,8 g (= 600 g/l) di 2,4 D acido

**Miscibilità:** Non miscelabile con fungicidi e insetticidi.

**Registrazione:** N° 133 del 23-07-1971

**Formulazione:** SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua



Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Frumento, Orzo, Avena, Segale (60 giorni)	<b>Erbe infestanti sensibili:</b> <i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica), <i>Ranunculus arvensis</i> (Ranuncolo dei campi), <i>Chenopodium album</i> (Farinello comune), <i>Sonchus arvensis</i> (Grespino dei campi), <i>Cirsium arvense</i> (Stoppione), <i>Raphanus raphanistrum</i> (Ravanello selvatico), <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa pastore comune), <i>Thlaspi arvense</i> (Erba storna), <i>Vicia</i> sp. (Veccia) <b>Erbe infestanti mediamente sensibili:</b> <i>Plantago</i> sp. (Plantaggini), <i>Anagallis arvensis</i> (Centocchio), <i>Papaver rhoeas</i> (Papavero), <i>Taraxacum officinale</i> (Soffione), <i>Urtica urens</i> (Ortica minore), <i>Convolvulus arvensis</i> (Vilucchio), <i>Rumex acetosella</i> (Acetosa minore), <i>Euphorbia helioscopia</i> (Erba calenzuola), <i>Vicia angustifolia</i> (Veccia), <i>Galinsoga parviflora</i> (Galinsoga)	0,6 - 1,2 l/ha	Dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili. Effettuare 1 solo trattamento per ciclo colturale.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame. U 46 D Fluid non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U 46 D Fluid devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.