



U 46[®] PRATI

●●● RESISTANCE BREAKER ●●●

Indicazioni di pericolo CLP  PERICOLO Frase H H302, H318, H412, EUH401		Confezioni 1 L 
Gruppo HRAC 0	Marchio registrato Nufarm Italia Srl	Titolare registrazione Nufarm Italia Srl
Gruppo imballaggio -	Trasporto ONU -	Classificazione ADR -

Caratteristiche: È una soluzione di sale dell'acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga (romice compreso), che infestano i cereali, medicai, trifogliai nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo per le leguminose foraggiere e per le graminacee.

Composizione: 2,4 DB 22,2% (= 250 g/l)

Miscibilità: U 46 Prati è compatibile con gli erbicidi a reazione neutra.

Registrazione: N° 13709 del 17-10-2011

Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua



Avversità controllate

Rumex sp. (Romice), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba cipollina), *Ranunculus* sp. (Ranuncolo), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Plantago* sp. (Piantaggine), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Sonchus* sp. (Crespo dei campi), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Artemisa vulgaris* (Artemisia), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Galeopsis tetrahit* (Canapa selvatica), *Lamium* sp. (Lamio), *Stellaria media* (Stellaria), *Veronica persica* (Veronica)

Culture (intervallo sicurezza)

Dosi

Modalità d'impiego

Prati polifiti, Diserbo foraggiere leguminose (medica, trifogliai) (prati, trifoglio 14 giorni)

5 - 7,2 l/ha

Diserbo foraggiere leguminose (medica, trifogliai): Trattare tra la 2° e la 4° foglia oppure dopo il primo sfalcio, al ricaccio della coltura e delle infestanti.

Prati polifiti

Interventi primaverili: diserbare con temperature non inferiori a 16-18°C, con leguminose tra la 1° e la 4° foglia trilobata (prati al primo anno) o tra la 1° foglia trilobata e l'inizio della fioritura (prati più vecchi), alla dose di 5-7,2 l/ha.

Interventi estivi: diserbare con temperature non inferiori a 24-25°C (nelle ore più calde della giornata) e con piante di romice vicine all'emissione dello scapo florale.

Numero massimo trattamenti: 1.

Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale (70 giorni per i cereali a semina invernale e primaverile)

4 - 5 l/ha

Intervenire durante la fase di levata.

Numero massimo trattamenti: 1.

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi ecc. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U 46 Prati devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari. Effettuare un saggio preventivo su una pianta piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità delle colture.