

# CITROLE®



## Olio minerale per trattamenti anticoccidici e contro le uova degli acari

**Caratteristiche:** Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato. Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola e penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa seguito un'azione irritante e quindi la morte per asfissia). Insetticida per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari delle piante da frutto (pomacee e drupacee), fico, noce, nocciolo, ribes, agrumi, olivo e piante ornamentali.

**Composizione:** Olio minerale paraffinico puro (U.R. 99 %) 97 g (= 825 g/l)

**Miscibilità:** Non miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, folpet.

**Registrazione:** N° 8534 del 30-07-1994

**Formulazione:** EC - Emulsione concentrata

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>PERICOLO</b> <b>Frasi H</b> H304, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 L - 10 L - 20 L 
<b>Gruppo IRAC</b> NC	<b>Marchio registrato</b> TotalErg	<b>Titolare registrazione</b> TotalErg
<b>Gruppo imballaggio</b> -	<b>Trasporto ONU</b> -	<b>Classificazione ADR</b> -

Culture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementine) (20 giorni)	Cocciniglie, uova di Acari	1,5-2 l/hl	I trattamenti si eseguono durante il periodo estivo, da giugno (quando il frutto raggiunge la grandezza di una noce) fino al periodo che precede l'invasiatura o durante il periodo invernale, dalla raccolta alla pre-fioritura.
Fruttiferi (pomacee, drupacee, noce, nocciolo, ribes) (20 giorni)	Cocciniglie, uova di Acari	1,5-2 l/hl	I trattamenti devono essere effettuati preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile-estivo all'apparire delle infestazioni.
Olivo (20 giorni)	Cocciniglie, uova di Acari	1,5-2 l/hl	Trattamenti alla fine dell'inverno (febbraio-marzo) o in estate.
Fico (20 giorni)	Cocciniglie, uova di Acari	1,5-2 l/hl	Effettuare i trattamenti durante il riposo delle piante.
Ornamentali	Cocciniglie, uova di Acari	2 l/hl	Trattare durante l'inverno. Non trattare durante la fioritura.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Non applicare su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature superiori a 30°C. Non trattare durante la fioritura. Qualora fossero effettuati trattamenti con formulati con i quali Citrole è incompatibile (prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, folpet) l'applicazione di Citrole deve essere effettuata almeno 10 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditiocarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo.

**Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni**