



## Fungicida specifico contro gli Oomiceti



**Caratteristiche:** Agron è un fungicida che agisce specificatamente nei confronti degli Oomiceti. Evidenzia una notevole efficacia nei confronti di *Phytophthora infestans* e *Plasmopara viticola*. È un prodotto ad azione preventiva di copertura. Agron è particolarmente indicato per la protezione del grappolo a partire dalla fase di post-allegagione.

**Composizione:** Zoxamide 4,3 g - Rame da ossicloruro 28,6 g

**Miscibilità:** Il prodotto si impiega da solo.

**Registrazione:** N° 14348 del 27-08-2008

**Formulazione:** WSB - Sacchetto solubile per polveri bagnabili

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>ATTENZIONE</b> <b>Frasi H</b> H317, H410, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 kg (2x500 g idrosolubile) 5 kg 
<b>Gruppo FRAC</b> 22 / M1	<b>Marchio registrato</b> Isagro Spa	<b>Titolare registrazione</b> Isagro Spa
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3077	<b>Classificazione ADR</b> 9

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (28 giorni)	Peronospora della vite ( <i>Plasmopara viticola</i> )	280-350 g/hl (minimo 2,8 kg/ha)	Per garantire una difesa efficace si suggerisce l'impiego preventivo di Agron a intervalli tra i trattamenti di 8-10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo in condizioni di basso rischio e in situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia. Non effettuare più di quattro applicazioni per anno. Non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con questo prodotto o con altri prodotti contenenti zoxamide. Per evitare l'insorgenza di resistenza è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Pomodoro (3 giorni)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	280-350 g/hl (minimo 2,8 kg/ha)	Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Si consiglia un intervallo di 7 giorni con la dose maggiore in situazioni di maggiore pressione epidemica. Non effettuare più di cinque applicazioni per anno. Non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con questo prodotto o con altri prodotti contenenti zoxamide. Per evitare l'insorgenza di resistenza è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Non si deve trattare durante la fioritura. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza di almeno 15 m dai corpi idrici superficiali.