



Armetil Cobre SC

Indicazioni di pericolo CLP  PERICOLO Frasi H H302, H318, H332, H410, EUH208, EUH401			Confezioni 1 L - 5 L 
Gruppo FRAC 4 / M1	Marchio registrato IQV Italia Srl	Titolare registrazione IQV Italia Srl	
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3082	Classificazione ADR 9	

Fungicida sistemico e di contatto

Caratteristiche: Armetil Cobre SC è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa.

Composizione: Metalaxil puro 3,5 g (=49 g/l)

Rame metallo 18,5 g (=259 g/l) (da idrossido di rame)

Registrazione: N° 12385 del 15-07-2009

Formulazione: SC - Sospensione concentrata



Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (28 giorni)	Peronospora	400 ml/hl	Effettuare 2-4 trattamenti ogni 14 giorni dall'epoca di pre-fioritura.
Melo (solo fino a inizio fioritura)	Fitoftora	100-150 ml/pianta	Intervenire con l'aggiunta di un bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi effettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.
Soia (150 giorni)	Peronospora, Fitoftora	4 l/ha	Effettuare 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
Pomodoro (14 giorni)	Peronospora	400 ml/hl	Effettuare 4 trattamenti ogni 14 giorni.
Fragola (40 giorni)	Fitoftora	3-4 l/ha	Effettuare 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3%.
Lattuga, Carciofo, Cavolo verza (20 giorni lattuga, carciofo - 60 giorni cavolo verza)	Peronospora, Alternaria, Bremia	3-4 l/ha	Effettuare 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.

Indicazioni per il corretto impiego - Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.