



# Corner MZ WG

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>PERICOLO</b> <b>Frasi H</b> H317, H334, H361d, H400, EUH401			<b>Confezioni</b> 1 kg - 10 kg 
<b>Gruppo FRAC</b> 4 / M3	<b>Marchio registrato</b> Sumitomo Chemical Italia	<b>Titolare registrazione</b> Cerexagri Italia Srl	
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3077	<b>Classificazione ADR</b> 9	

## Fungicida antiperonosporico

**Caratteristiche:** Corner MZ WG è un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la peronospora.

**Composizione:** Metalaxyl puro 8 g - Mancozeb puro 64 g

**Miscibilità:** Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più co-

mune impiego fatta eccezione per la poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

**Registrazione:** N° 15325 del 15-05-2012

**Formulazione:** WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)



Culture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (28 giorni)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250 g/hl	Eseguire il trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e successivamente intervenire ad intervallo di 10-14 giorni. Anche in condizioni climatiche tali da favorire il persistere di un'elevata e continua pressione di infezione l'attività sistemica e la persistenza d'azione di Corner MZ WG sono tali da assicurare in ogni caso la protezione della coltura inclusa la nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro. In tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo, nella fase più delicata e di maggior pericolo per la coltura.
Tabacco (28 giorni)	Peronospora	250 g/hl	Trattare dopo la crisi del trapianto ogni 12-14 giorni.
Pomodoro (14 giorni)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 g/hl	Trattare da quando avvengono le condizioni favorevoli all'infezione primaria.
Floreali (rosa, garofano)	Peronospora	250 g/hl	Trattare ogni 15 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto è tossico per gli insetti utili.