


CRITTAM® WG

Indicazioni di pericolo GLP  PERICOLO		Confezioni 1 kg - 5 kg - 20 kg 
Frase H H302, H317, H318, H330, H373, H410, EUH401		
Gruppo FRAC M3	Marchio registrato Sumitomo Chemical Italia	Titolare registrazione Taminco Italia Srl
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3077	Classificazione ADR 9

Fungicida organico per trattamenti liquidi in frutticoltura

Composizione: Ziram puro 76 g

Miscibilità: Miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra.

Registrazione: N° 3800 del 19-06-1980

Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)



Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Melo (fine fioritura)	Ticchiolatura	180-250 g/hl (max 3 kg/ha)	Fino a fine fioritura. Max 4 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Pero (60 giorni)	Ticchiolatura, Maculatura bruna	180-250 g/hl (max 3 kg/ha)	Max 4 trattamenti dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Nespolo (60 giorni)	Ticchiolatura	180-250 g/hl (max 3 kg/ha)	Max 4 trattamenti dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Pesco (fine fioritura)	Bolla, Corineo	200-450 g/hl (max 3 kg/ha)	Trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura. Max 3 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Ciliegio, Susino (fine fioritura)	Corineo	200-450 g/hl (max 3 kg/ha)	Trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura. Max 3 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Mandarlo (150 giorni)	Bolla, Corineo	200-450 g/hl (max 3 kg/ha)	Trattamenti autunno-vernini. Max 3 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

Indicazioni per il corretto impiego - Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con Crittam WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacci ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.