

Emerald[®] Combi



Fungicida sistemico e di contatto ad ampio spettro per la lotta contro l'oidio della vite, del melone, del cetriolo e dello zucchini

Caratteristiche: Emerald Combi è un fungicida sistemico e di contatto a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione, e di zolfo. Emerald Combi consente di ottenere un'ottima protezione in trattamenti preventivi, curativi e bloccanti. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione del programma di trattamenti adottato.

Composizione: Tetraconazolo puro 0,94 g - Zolfo puro (esente da selenio) 40 g

Miscibilità: Non compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con DDVP, con Diclofluanide.

Registrazione: N° 9449 del 23-12-1997

Formulazione: WSB - Sacchetto solubile per polveri bagnabili

| | | |
|---|---|--|
| Indicazioni di pericolo CLP  ATTENZIONE Frasi H H315, EUH401 | | Confezioni 1 kg (4x250 g idrosolubile)  |
| Gruppo FRAC 3 / M2 | Marchio registrato Isagro Spa | Titolare registrazione Isagro Spa |
| Gruppo imballaggio - | Trasporto ONU - | Classificazione ADR - |

| Colture (intervallo di sicurezza) | Avversità controllate | Dosi | Modalità d'impiego |
|--|---|--------------|---|
| Vite (14 giorni) | Oidio (<i>Uncinula necator</i>) | 200-250 g/hl | Assicurare una buona bagnatura della vegetazione. Effettuare 4-5 applicazioni in pre e post-fioritura (fase di maggiore suscettibilità al patogeno), ad intervalli di 12-14 giorni, in funzione della pressione della malattia. In apertura e chiusura del calendario di lotta è consigliabile l'impiego di antioidici di copertura tradizionali. |
| Cucurbitacee (melone, cetriolo, zucchini) (7 giorni) | Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) | 500 g/hl | Effettuare 2-3 applicazioni ad intervalli di 10-14 giorni, rispettando i tempi minori quando si verificano le condizioni più favorevoli allo sviluppo della malattia. |

Indicazioni per il corretto impiego - Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali. Quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo presente potrebbe dare luogo a fenomeni di fitotossicità su Cucurbitacee in serra o sotto tunnel e Vite varietà Sangiovese.