



Rizolex[®] GOLD

Indicazioni di pericolo CLP  ATTENZIONE Frasi H H317, H411, EUH401		Confezioni 1 kg 
Gruppo FRAC 14	Marchio registrato Sumitomo Chemical Company Tokyo	Titolare registrazione Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3077	Classificazione ADR 9

Fungicida a lunga persistenza per il controllo della rizottoniosi

Caratteristiche: Rizolex Gold è un fungicida organico in grado di controllare gli attacchi di *Rhizoctonia* sp. di lattughe e altre insalate, della patata, delle colture floreali ed ornamentali e di prati e tappeti erbosi.

Composizione: Tolclofos Metile 50 g

Miscibilità: Il prodotto non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina. Non è comunque raccomandata la miscelazione di Rizolex Gold con altri prodotti fitosanitari.

Registrazione: N° 7961 del 22-03-1991

Formulazione: WP - Polvere bagnabile



Culture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Lattughe e altre insalate in serra (28 giorni)	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 kg/ha utilizzando volumi d'acqua di 100-1000 l/ha	Effettuare un trattamento al trapianto. È consentito un solo trattamento per ciclo colturale.
Patata (concia dei tuberi)	<i>Rhizoctonia solani</i>	50 g di prodotto diluiti in 16,5-20 l di acqua per 100 kg di tuberi	Effettuare la concia umida dei tuberi intervenendo prima della semina. È consentito un solo trattamento all'anno.
Floreali	<i>Rhizoctonia</i> sp.	32 kg/ha	Su floreali che si propagano per via vegetativa (talea, rizoma, bulbo o tubero) intervenire in pre-trapianto lungo il solco di semina/trapianto provvedendo poi all'incorporamento del prodotto al terreno. La dose di impiego è di 32 kg di prodotto per ettaro, distribuiti con 300-600 l di acqua/ha mediante attrezzature montate su trattore o con pompa a spalla. È consentito un solo trattamento per ciclo colturale.
Ornamentali in serra	<i>Rhizoctonia</i> sp.	32 kg/ha	Intervenire al trapianto effettuando un trattamento al terreno mediante sistemi di fertirrigazione o con irrorazioni con annaffiatore o pompa a spalla, avendo cura di distribuire il prodotto con volumi d'acqua elevati compresi tra 10 e 100 hl/ha. È consentito un solo trattamento per ciclo colturale.
Prati e tappeti erbosi (campi da golf, impianti sportivi in genere)	<i>Rhizoctonia</i> sp.	32 kg/ha diluiti con 200-400 l/ha di acqua	Effettuare un trattamento al terreno. È consentito un solo trattamento all'anno.

Indicazioni per il corretto impiego - Sulle cultivar poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di effettuare preventive prove parcellari. Non trattare colture sofferenti per gelo, siccità od altre cause abiotiche.