



# Sakura®

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>PERICOLO</b> <b>Frasi H</b> H304, H318, H336, H361d, H410, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 L - 5 L 
<b>Gruppo FRAC</b> 3	<b>Marchio registrato</b> Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	<b>Titolare registrazione</b> Nufarm Italia Srl
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3082	<b>Classificazione ADR</b> 9

**Fungicida per il controllo di fusariosi, ruggini e septoria del frumento**

**Composizione:** Bromuconazolo 167 g/l - Tebuconazolo 107 g/l

**Miscibilità:** Miscibile con i prodotti comunemente utilizzati per la difesa del frumento.

**Registrazione:** N° 15199 del 20-03-2013

**Formulazione:** EC - Emulsione concentrata



Culture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Frumento (duro e tenero)	Fusariosi ( <i>Fusarium</i> sp.), Ruggini ( <i>Puccinia</i> sp.), Septoria ( <i>Septoria</i> sp.)	1,2 l/ha	Intervenire alla dose di 1,2 litri per ettaro, posizionando l'applicazione da inizio levata alla fioritura. Contro la fusariosi della spiga ( <i>Fusarium</i> sp.) il trattamento andrà effettuato da fine spigatura a fioritura.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Usare il prodotto una sola volta per anno.