

IMPACT[®] 250 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante per la lotta contro il brusone e l'elmintosporiosi del riso.

Meccanismo d'azione: FRAC 3

IMPACT 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n. 12790 del 05/11/2008

Composizione:

FLUTRIAFOL puro g. 22,7 (=250 g/L)

Coformulanti* q.b. a g. 100

*EUH208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti, 24 – 24124 Bergamo

Tel. 03519904468

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1 litro

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319: Provoca grave irritazione oculare. H332: Nocivo se inalato H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PREVENZIONE: P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P391: raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401: Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Distribuito da:

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl

Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harbøre (Danimarca)

PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)

CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co KG - Stade (Germania)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)



ATTENZIONE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del prodotto concentrato usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

FLUTRIAFOL, sostanza attiva contenuta in IMPACT 250 SC, appartiene al gruppo dei fungicidi triazolici (DMI) (Codice MoA 3). Agisce interferendo con la biosintesi dell'ergosterolo, inibendo la dimetilazione degli steroidi. E' dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante. È assorbito dalle foglie e dai tessuti verdi e quindi traslocato in modo acropeto attraverso lo xilema alle foglie e ai germogli.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Frumento, Orzo

Contro Oidio (*Erysiphe graminis* f. sp. tritici, *Erysiphe graminis* f. sp. hordei), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria tritici*) alla dose di 0,5 L/ha, intervenendo dalla fine dell'accostamento all'inizio della fioritura. Impiegare un volume di acqua di 150-300 lt/ha

Riso

Contro "Brusone" (*Pyricularia oryzae*) ed Elmintosporiosi (*Drechslera oryzae*), 500 ml/ha. Iniziare gli interventi dalla fine della levata, alla comparsa dei primi sintomi delle malattie. Impiegare un volume di acqua di 400-600 L/ha

COMPATIBILITÀ

IMPACT 250 SC è miscibile con formulati a base di: ditia-non, mancozeb, thiram, ossicloruro di rame e zolfo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Per evitare fenomeni di resistenza alternare il prodotto con altri a diverso meccanismo di azione (MoA). Effettuare al massimo 1 applicazione per stagione su tutte le colture.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su riso. Su Frumento e Orzo trattamenti consentiti fino all'inizio della fioritura.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO