

KELLY R DF
Granuli idrodispersibili

FUNGICIDA PER LA DIFESA DI VITE, AGRUMI, ORTICOLE, ORNAMENTALI.

KELLY R DF

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Rame metallo (da ossicloruro tetramico)	g.	25
Fosetil alluminio	g.	25
Coformulanti	q. b. a g.	100

Registrazione Ministero della Salute n° 12714 del 28/11/2008

Titolare della registrazione: **ISAGRO S.p.A.** - Centro Uffici San Siro - Fabbriato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italia- Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02452801

Stabilimenti di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Indicazioni di Pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari - H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso


Consigli di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico – P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto in conformità della normativa vigente.

Contenuto netto: g 200 - 250 - 500 – kg 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 Kg

Partita N°

PERICOLO



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil alluminio 25%, Rame 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOSETIL ALLUMINIO. --

RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche ad-dominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un'associazione di due principi attivi dalle caratteristiche complementari. Il rame è dotato di azione di copertura e resistenza al dilavamento, il Fosetil alluminio è dotato di sistemica ascendente e discendente e di lunga persistenza d'azione. KELLY R DF è particolarmente efficace nei confronti delle Peronosporacee e, data la presenza del rame, alle dosi sottoindicate presenta una efficacia battericida collaterale. La formulazione in granuli idrodispersibili ne rende l'impiego comodo e sicuro per l'operatore.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per la vite, 1500-1800 l/ha per altri fruttiferi, 600-800 l/ha per colture erbacee (fragola compresa) e ornamentali. Nel caso di impieghi a volume ridotto, adeguare di conseguenza la concentrazione in modo da mantenere costante la dose distribuita per unità di superficie.

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo - Antracnosi (*Colletotrichum gloeosporioides*), Mal secco degli agrumi (*Deuterophoma tracheiphila*), Allupatura (*Phytophthora citrophthora*), Marciume o gommosi del colletto (*Phytophthora citrophthora*): irrorazioni fogliari alla dose di 500 g per 100 litri di acqua in primavera ed in autunno.

Fragola - Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*): irrorazioni fogliari: intervenire alla dose di 150-320 grammi per 100 litri di acqua effettuando un trattamento in autunno e due in primavera.

Vite - Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 250-400 g per 100 litri d'acqua (pari a 2,5-4 kg/Ha) ogni 8-12 giorni. Adottare la dose più alta e gli intervalli più brevi quando le condizioni climatiche ed infettive favoriscono la malattia.

Pero – contro Maculatura bruna alla dose di g 200 per 100 litri d'acqua. Alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme alla dose di 100 g per 100 litri di acqua. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

Pomodoro - Alternariosi delle solanacee (*Alternaria solani*), Peronospora del pomodoro (*Phytophthora infestans*), Septoria del pomodoro (*Septoria lycopersici*) - azione collaterale su Batteriosi (*Pseudomonas syringae*, *Xanthomonas campestris*): intervenire alla dose di 4-5 kg/ha ogni 8-12 giorni.

Cocomero, Melone - Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*): intervenire alla dose di 5 kg/ha ogni 8-12 giorni.

Spinacio – Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi: intervenire alla dose 3-5 kg/ha nei periodi di maggior rischio infettivo.

Carciofo - Peronospora della lattuga (*Bremia lactucae*): intervenire alla dose di 4-6 kg/ha ogni 8-12 giorni.

ORNAMENTALI - Peronospora spp. - *Bremia* spp. (Peronospore delle ornamentali): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 400-600 g per 100 litri d'acqua.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, etc.), quelli contenenti Thiram, gli oli e con i concimi fogliari azotati.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su varietà poco note di colture orticole ed ornamentali od in caso di dubbi è necessario compiere piccoli saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera superficie.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, SPINACIO, COCOMERO, MELO-NE, POMODORO, 30 GIORNI PER FRAGOLA, 40 GIORNI PER VITE, 20 GIORNI PER AGRUMI

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con DD del 12.09.14