

NEMASOL 10L

Nematocida liquido solubile in acqua (SL)

MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 1A

NEMASOL 10L - Registrazione del Ministero della Salute n. 17282 del 30/07/2018

Composizione:

Oxamyl puro g. 9,62 (100 g/L)

Coformulanti q.b. a g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 961321700

DISTRIBUITO DA:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Tel 02 452801

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna



PERICOLO

Partita n°

Contenuto netto: 1-5-10L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H300 Letale se ingerito. H330 Letale se inalato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P304+P340+P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Indossare tuta e abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione e caricamento del prodotto. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non trattare in fioritura durante i periodi in cui la serra è parzialmente aperta.

Rispettare un periodo di 24 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 73 giorni per l'introduzione degli insetti utili.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli acidi e su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI.**

CARATTERISTICHE

NEMASOL 10L è un prodotto nematocida liquido solubile in acqua contenente il 10% della sostanza attiva Oxamyl, dotata di azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto. NEMASOL 10L risulta efficace contro nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.* e *Ditylenchus spp.*)

Il prodotto va disciolto nell'acqua di irrigazione e deve essere distribuito al terreno mediante gli impianti di irrigazione a goccia. In talune condizioni la diluizione e la distribuzione del prodotto in acqua irrigua acidificata ad un valore di pH di circa 5,5 ne migliorano l'assorbimento e la disponibilità per l'apparato radicale.

DOSI D'IMPIEGO

Culture in serra: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino.

Intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 10 L/ha, effettuando massimo 3 trattamenti per ciclo colturale ad una distanza di 20 giorni.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Sebbene non siano noti casi di resistenza all'Oxamyl, allo scopo di evitare l'insorgenza di popolazioni di nematodi con ridotta sensibilità al prodotto, si consiglia di applicare NEMASOL 10L strettamente in accordo con la presente etichetta ed in alternanza con altri formulati caratterizzati da un diverso meccanismo d'azione. Non impiantare colture in successione su terreni trattati con il prodotto prima che siano passati 120 giorni.

FITOTOSSICITÀ

NEMASOL 10L è selettivo nei confronti delle più comuni colture attualmente presenti sul mercato, in caso di introduzioni di nuove varietà si consiglia comunque di effettuare dei saggi preliminari su scala ridotta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO